



INFORMACIÓN TÉCNICA

CABZIREY®



BIONUTRIENTE EVITA LA CAIDA DE FLOR Y FRUTO

1. Generalidades:

CABZIREY es un bionutriente corrector de nutrientes y polisacáridos sinergizados por procesos de fermentación bio orgánica, que contienen enzimas bioactivadoras formando complejos de CALCIO, BORO y ZINC, quelatizados con ácidos orgánicos y etanolamina además contiene extractos orgánicos, aminoácidos algas marinas y aditivos que potencializan y corrigen las deficiencias nutricionales de las plantas.

CABZIREY con su fórmula especial de CALCIO, BORO, ZINC y otra nutriente perfectamente balanceada activa los procesos de elongación celular, evita la muerte de yemas apicales, corrige el crecimiento retardado y uniformiza el llenado de granos, semillas y frutos.

CABZIREY estimula la producción de auxinas naturales, el desarrollo de los tejidos meristemáticos jóvenes, logrando mejores brotes; corrige las deficiencias como, quemadura de puntas (aunque también afecta a otros cultivos), pudrición apical (blossom-end rot) en tomates y pimientos, (tip burn) en lechuga y hoyo agrio (bitter pit) en manzanas.

CABZIREY actúan induciendo el crecimiento radicular, la floración y el amarre de flor y fruto en la planta, además aumenta el peso, calibre y vida post cosecha de los frutos. El Calcio fortalece las paredes celulares de la planta, previniendo y corrigiendo los desórdenes fisiológicos como la pudrición apical del fruto. El boro mejora el crecimiento de los tubos polínicos asegurando la polinización, fecundación y cuajado de los frutos además mejorará el transporte de azúcares a través de las células. El Zinc activa la síntesis de Auxinas y hormonas naturales de la planta, lo cual mejora los rendimientos calidad y duración de los frutos.

Composición:

Calcio (Ca)(*)	22.5%
Boro (B) (**)	2.5 %
Zinc (Zn) (*)	3.0 %
Agente Quelatizante: (*) Ácidos orgánicos. (**) Etanolamina	
Aminoácidos	1.5 %
Extractos de algas marinas	2.0 %
Ácidos carboxílicos	2.5 %
Magnesio (Mg)	3.0 %
Hierro (Fe)	750 ppm
Manganeso (Mn)(EDTA).....	1300 ppm
Cobre (Cu)(EDTA).....	550 ppm
Molibdeno (Mo).....	20.0 ppm
Extractos orgánicos	8.0 %
Complejo Vitamínico.....	5%
Aditivos c.s.p.	1Lt.

Oficina: Calle Mama Ocllo N° 416
La perla - Callao – Lima – Perú
E-mail: ventas@reytaperu.com
www.reytaperu.com
Teléfono: (051) (01) 4400917
Celular: 978512250



*“Comprometidos con
la
salud y la vida”*



INFORMACIÓN TÉCNICA

CABZIREY®



2. Ventajas:

- **CABZIREY** por su alto contenido de Calcio evita la muerte de la yema apical, previene la caída de las flores, mejora el cuajado, la caída de los frutos y la durabilidad de los frutos de postcosecha.
- **CABZIREY** mejora la calidad de los frutos en color, sabor y consistencia; así como también la prevención al ataque de patógenos.
- **CABZIREY** evita la caída de flores y frutos cuajados debido que el Ca disponible induce la formación de pectatos de calcio, sustancia que brinda fortaleza a las paredes celulares y por tanto refuerza los tejidos vegetales de la planta, esta misma propiedad brinda protección a las plantas frente al ataque de plagas.
- **CABZIREY** disminuye la incidencia de desórdenes fisiológicos por deficiencias de Ca como la podredumbre apical del tomate (blossom end Rot), mancha café en piña, corazón negro en apio, quemadura de borde en lechuga, rajado carencial de frutos, acorchado del manzano, etc.
- **CABZIREY** brinda Boro de fácil asimilación, este nutriente está relacionado con la buena conformación y diferenciación de los tejidos de la planta que junto con el Ca actúa como regulador del metabolismo vegetal; mantiene la firmeza y permeabilidad de la membrana, favorece la fecundación de las flores para lograr una mayor cuaja de frutos.
- Incrementa la resistencia de las plantas a las enfermedades.

3. Compatibilidad:

CABZIREY es compatible con todos los productos fitosanitarios comúnmente utilizados, a excepción de mezclas con cobres, azufres, productos altamente alcalinos y con aceites minerales, se recomienda antes de la mezcla realizar una prueba de compatibilidad.

4. Recomendaciones de uso:

CABZIREY se aplica en pulverizaciones por vía foliar como por vía radicular mediante los diferentes sistemas de fertirriego. Los equipos deben estar en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

Antes de usarse agitar fuertemente, luego medir la cantidad adecuada y mezclar disolviendo en un recipiente pequeño que puede ser un balde de 10 litros, luego adicionarlo al cilindro con agua hasta la mitad finalmente llenar el volumen completo de agua agitando fuertemente para hacer una buena homogenización.





INFORMACIÓN TÉCNICA

CABZIREY®



5. Usos y dosis.

CULTIVO	DOSIS		RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN
	(L/200 L Agua)	(L/Ha)	
ALGODÓN	0.5 - 1	2 - 3	*Aplicar después del desahije . * Antes de la floración e inicio de botones.
PAPA, CAMOTE, YUCA Y MACA.	0.5 - 1	1 - 3	*Aplicar después del aporque, repetir cada 20 días hasta el llenado del tuberculo.
CEBOLLA, AJOS Y CEBOLLA CHINA	0.5 - 1	1 - 2	*Al inicio de 5 a 10 cm de crecimiento. * Luego a los 30 días y 30 días antes de la cosecha.
AJÍ PÁPIKRA, PIQUILLO Y PIMIENTO.	0.5 - 1	1 - 3	*Antes de la floración. *Después del cuajado
COLIFLOR, BRÓCOLI, REPOLLO, ACELGA, ESPINACA, NABO, ZANAHORIA, BETERRAGA, RABANITO, LECHUGA, CULANTRO Y OTRAS HORTALIZAS	0.5 - 1	1 - 3	*A los 7 días después del trasplante o emergencia. *Aplicar 2 veces mas durante el cultivo.
CAFÉ, CACAO Y GRANADILLA	0.5 - 1	2 - 3	*Aplicar antes de la floración. * Durante el cuajado del fruto.
ALCACHOFA	0.5 - 1	2 - 3	* Aplicar antes del inicio del capítulo. * Repetir 2 - 3 aplicaciones.
LENTEJA, ARVEJA, FRIJOL, PALLAR, HABA, HOLANTAO	0.5 - 1	2 - 3	* Aplicar antes de floración y llenado de las vainas.
ARROZ	0.5 - 1	1 - 3	* Primeras etapas del crecimiento y después del macollamiento.
QUINUA	0.5 - 1	2 - 3	* Aplicar al inicio de panojamiento. * Repetir cada 20 días.
ZAPALLO, MELÓN, SANDÍA, PAPAYA	0.5 - 1	2 - 3	*Antes de la floración femenina, luego otra al crecimiento del fruto y repetir cada 12 días hasta la cosecha.





INFORMACIÓN TÉCNICA

CABZIREY®



6. Precauciones:

CABZIREY: Tiene baja toxicidad sin embargo se debe guardar las precauciones del manejo de pesticidas en general: No transportar ni almacenar con productos alimenticios, bebidas ni medicinas. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa si esto ocurriera lavar inmediatamente con abundante agua y jabón.

Almacenar fuera del alcance de los niños.

No comer, beber, masticar chicle, fumar, etc. durante las operaciones de mezcla y aplicación

CABZIREY: no tiene restricciones de uso.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y dépositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



CENTRO DE LLAMADO
REYTA S.A.C.

(051) (01) 440 – 0917
Calle Mama Ocllo N° 416
La perla - Callao
LIMA - PERÚ

