



INFORMACIÓN TÉCNICA

Enrofloxacin 10[®]
Oral



Solución oral para uso veterinario Potente antibiótico de amplio espectro

INDICACIONES:

Antibacteriano en solución oral (para administración en el agua de bebida). Indicado para el tratamiento de infecciones causadas por bacterias grampositivas, gramnegativas y micoplasmas sensibles a la Enrofloxacin del sistema respiratorio, gastrointestinal, genitourinario, conducto auditivo y piel en aves, conejos, cuyes, bovinos y porcinos.

COMPOSICIÓN:

Enrofloxacin 10 g
Excipientes c.s.p 100 ml

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

DOSIFICACIÓN:

Aves (pollos y pavos), conejos y cuyes: 100 mg de Enrofloxacin/kpv = 0.1 ml de producto/kpv/día, durante 3 a 5 días consecutivos.

En conejos y cuyes durante 5 días consecutivos.

Bovinos y porcinos: Diluir el producto en el agua de bebida, leche o leche de reemplazo a razón de 5 a 10 mg por kg de peso vivo (1ml producto cada 10 a 20 kg de peso vivo acorde a la dosificación).

En base a la dosis recomendada, al número y al peso vivo de los animales a tratar, la cantidad diaria exacta de medicamento veterinario debe ser calculada de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{ML de producto/L de agua} = \frac{0.1 \text{ ml del producto/kpv} \times \text{pv promedio de animales (kg)}}{\text{Consumo medio de agua (L/día)}}$$

El agua de bebida medicada debe ser removida diariamente justo antes de ofrecerla a los animales. Los animales tienen que disponer de acceso suficiente al sistema de suministro de agua medicada para asegurar un consumo adecuado. El agua de bebida debe estar medicada durante todo el periodo de tratamiento y debe ser la única fuente de agua de bebida.

INTERVALO ENTRE DOSIS: Cada 24 horas a criterio del Médico Veterinario tratante. Preparar la dilución diariamente.

MARGEN DE SEGURIDAD: El producto tiene amplio margen de seguridad en las dosis y especies de destino, y es muy poco probable que se produzcan reacciones adversas.

PERIODO DE RETIRO:

- Carne: Pollos (pollos de engorde), bovinos y porcinos 7 días, Pavos 13 días, conejos y cuyes 15 días.





INFORMACIÓN TÉCNICA

Enrofortex 10[®]
Oral



- No administrar a vacas en producción de leche para consumo humano.
- No administrar a ponedoras en producción de huevos para consumo humano.

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO:

- No usar como profilaxis.
- No usar cuando se conozca la presencia de resistencia/resistencia cruzada a las fluoroquinolonas en las aves de destino del tratamiento.
- No usar en caso de hipersensibilidad conocida a la sustancia activa, a otras fluoroquinolonas.

PRECAUCIONES GENERALES:

- Administrar el producto solo por la vía de administración indicada. No se recomienda su uso en otras especies que no sean las autorizadas.
- El uso de fluoroquinolonas debe ser reservado para el tratamiento de aquellos casos clínicos que hayan respondido pobremente, o se espera que respondan pobremente, a otras clases de antimicrobianos.
- Siempre que sea posible las fluoroquinolonas debe ser usadas después de realizar una prueba de sensibilidad.

CONSERVACION DEL PRODUCTO:

- Almacenar en lugar fresco entre 15° y 30° C.
- Proteger de la humedad y la luz.

PRESENTACIONES:

ENROFORTEX 10 ORAL se encuentra disponible en las siguientes presentaciones:
Gotero x 30 mL, frascos 100, 250, 500 mL, 1 y 4 L.

Manténgase fuera del alcance de los niños y de animales domésticos



CENTRO DE LLAMADO
REYTA S.A.C.
(051) (01) 440 – 0917
Calle Mama Ocllo N° 416
La perla - Callao
LIMA - PERÚ

Calle Mama Ocllo N° 416
La perla – Callao – Lima- Perú
E-mail: ventas@reytaperu.com
www.reytaperu.com
Teléfono: (051) (01) 4400917



*“Comprometidos con
la
salud y la vida”*