

INFORMACIÓN TÉCNICA



Oxitetraciclina 20% + Ketoprofeno 3%
Ketomicina[®]
L.A.



Solución inyectable para uso veterinario

Antibacteriano de amplio espectro con antiinflamatorio, antipirético y analgésico

COMPOSICIÓN:

Cada 100 ml contiene:

Oxitetraciclina 20 g
Ketoprofeno 3 g
Excipientes c.s.p. 100 ml

DESCRIPCIÓN:

Antibacteriano de amplio espectro formulado a base de oxitetraciclina con un vehículo especial de larga acción asociada a ketoprofeno un antiinflamatorio de última generación no esteroideal, antipirético y analgésico que no causa aborto, por su formulación especial se obtiene un efecto prolongado con altos niveles plasmáticos de 3 a 5 días, por lo que con una sola aplicación es suficiente para combatir los microorganismos sensibles a la oxitetraciclina.

INDICACIONES DE USO:

Antibacteriano – antiinflamatorio de amplio espectro y larga acción, indicado para todos los procesos infecciosos sensibles a la Oxitetraciclina, y con acción antiinflamatoria del Ketoprofeno (de última generación y no corticoide) para cuadros inflamatorios, dolorosos y febriles.

Agentes etiológicos susceptibles: *Actinobacillus lignieresii, Actinomyces bovis, Aerobacter aerógenes, Anaplasma marginale, Bacillus anthracis, Borrelia anserina, Clostridium chauvoei, hemolyticum, novyi, perfringes B, C, D, septicum, tetani, Corynebacterium equi, pyogenes, renale, Dermatophilus congolensis, Erysipelothrix insidiosa, Escherichia coli, Fusiformis necrophorus, haemophilus spp., hemophilus suis, Leptospira spp., Listeria monocytogenes, moraxella bovis, Mycoplasma spp., Pasteurella anatipestifer, Mannheimia (Pasteurella) hemolytica, Pasteurella multocida, Salmonella abortus-ovis, Shigella equirulis, Staphylococcus aureus, hyicus, hyos, Streptococcus agalactiae, dysgalactiae, equi, uberis, Vibrio fetus.*

Bovinos: Complejo neumónico del transporte (neumonía-fiebre del transporte), panadizo, difteria, enteritis bacteriana (diarrea) actinobacilosis, leptopirosis, anaplasmosis, antrax (carbuncho), heridas infectadas, metritis agudas, pietin, mastitis septicémicas, infecciones umbilicales/articular, dermatophilosis y en todas infecciones no específicas. Infecciones bacterianas secundarias a enfermedades víricas.

Camélidos Sudamericanos, Ovinos y Caprinos: Neumonías, Carbuncho sintomático, mastitis septicémicas, bedsoniasis, prevención de infecciones post-parto, y en todas las infecciones

Oficina: Calle Mama Ocllo N° 416 - La Perla
Callao – Lima – Perú
E-mail: ventas@reytaperu.com
www.reytaperu.com
Teléfono: (051) (01) 4400917



“Comprometidos con
la
salud y la vida”



INFORMACIÓN TÉCNICA

Oxitetraciclina 20% + Ketoprofeno 3%

Ketomicina[®]
L.A.



específicas o no, causada por microorganismos susceptibles a la oxitetraciclina. Infecciones bacterianas secundarias a enfermedades víricas.

Porcinos: Enteritis bacteriana (diarrea, colibacilosis), neumonías, leptospirosis, rinitis atrófica, erisipelas, infecciones postquirúrgicas, infecciones umbilicales/auricular. En cerdas es apropiado como adyuvante en el control de las enteritis infecciosas (diarrea de los recién nacidos, colibacilosis) en los lechones y en el síndrome MMA (mastitis-metritis-agalactia) infecciones bacterianas secundarias a enfermedades víricas.

DOSIFICACION: Vía intramuscular o subcutánea.

ESPECIES DE DESTINO Y DOSIS:

Bovino, ovino, caprino, camélidos sudamericano y porcino: 1 ml por 10 kg de peso vivo.

En aplicaciones intramusculares y subcutáneas se aconseja que el volumen administrado por lugar de aplicación se reduzca de acuerdo con la edad y el tamaño del animal para que en el caso de los animales más pequeños solo se le inyecta de 1 a 4 mL por lugar de aplicación. Se debe de inyectar no más de 10 mL por lugar de aplicación en ganado adulto y 5mL en cerdos, ovinos y camélidos adultos.

Dosis única, o a criterio del Médico Veterinario tratante.

Si bien es cierto por la característica del producto, en la mayoría de los casos será suficiente una sola aplicación, sin embargo, pueden existir casos donde se requiera una segunda aplicación 48 horas después. De no ceder, se recomienda reevaluar el diagnóstico.

PERIODO DE RETIRO:

Carne: 28 días

Leche: No administrar en ganado lechero destinado para el consumo humano.

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO.

- No usar en pacientes con insuficiencia renal o hepática.
- No usar en animales con hipersensibilidad a los principios activos.

PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE SU USO.

- Usar guantes y lavarse las manos tras utilizar el medicamento.
- Si se produce accidentalmente exposición de la piel o los ojos, lavar inmediatamente con agua abundante.
- No fumar, comer o beber mientras se manipula el medicamento.

CONSERVACION DEL PRODUCTO:

- Almacenar en lugar fresco entre 15° y 30°C.
- Proteger de la humedad y la luz solar.

Oficina: Calle Mama Ocllo N° 416 - La Perla
Callao – Lima – Perú
E-mail: ventas@reytaperu.com
www.reytaperu.com
Teléfono: (051) (01) 4400917



*“Comprometidos con
la
salud y la vida”*

INFORMACIÓN TÉCNICA



Oxitetraciclina 20% + Ketoprofeno 3%
Ketomicina[®]
L.A.



PRESENTACIONES:

Ketomicina L.A. se encuentra disponible en las siguientes presentaciones:

Frascos x 10, 20, 50, 100, 250, 500 mL.

Manténgase fuera del alcance de los niños y de animales domésticos



CENTRO DE LLAMADO
REYTA S.A.C.

(051) (01) 440 - 0917
Calle Mama Ocllo N° 416 – La perla
CALLAO - LIMA - PERÚ

Oficina: Calle Mama Ocllo N° 416 - La Perla
Callao – Lima – Perú
E-mail: ventas@reytaperu.com
www.reytaperu.com
Teléfono: (051) (01) 4400917



*“Comprometidos con
la
salud y la vida”*