

INFORMACIÓN TÉCNICA



SULFAQUINOXALINA 20%+ TRIMETOPRIM 4% + VITAMINA K3 0.2%
ProtectorK-ST[®]
POLVO SOLUBLE



Polvo soluble para uso veterinario

POTENTE ANTIBACTERIANO DE AMPLIO ESPECTRO Y ANTICOCIDIANO

COMPOSICIÓN:

Cada 100 g contiene:

Sulfaquinoxalina sódica	20.0 g
Trimetoprim glutamato	4.0 g
Vitamina K3	0.2 g
Excipientes c.s.p.	100.0 g

INDICACIONES:

ProtectorK-ST está indicado para tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas digestivas, respiratorias, piel y urogenitales en aves, bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, conejos y cuyes; combatiendo a los agentes infecciosos bacterianos y coccidios, atenuando paulatinamente el principal síntoma la hemorragia.

Enfermedades susceptibles:

Cerdos: Rinitis atrófica, enterotoxemia, colibacilosis, salmonelosis, diarreas, corinebacteriosis, erisipelosis, dermatitis, metritis-mastitis-agalactia y coccidiosis.

Aves: (Pollos, gallos y pavos) Salmonelosis, colibacilosis, cólera, coriza, estafilo y estreptococosis, saculitis, sinusitis, sinovitis, dermatitis gangrenosa y coccidiosis.

Bovinos, ovinos, caprinos, conejos y cuyes: Infecciones respiratorias, entéricas y diarreas por Salmonella spp y E. coli, enterotoxemia y coccidiosis.

ESPECIES DE DESTINO:

Bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, aves, conejos y cuyes.

DOSIFICACION:

Bovinos y porcinos: 1g /8Kg de p.v.

Ovinos y Caprinos: 15g /20 L de agua de bebida.

Aves: 1g /8 Kg p.v.

Conejos: 15 g /10 L de agua de bebida.

Cuyes: 45 g /10 L de agua de bebida.

ADMINISTRACIÓN:

Aves, bovinos y porcinos: Vía oral en agua de bebida o mezclado con el alimento.

Ovinos, caprinos, conejos y cuyes: en agua de bebida.

Oficina: Jr. Tupac Amaru N° 1590- La Perla
Callao – Lima – Perú
E-mail: ventas@reytaperu.com
www.reytaperu.com
Teléfono: (051) (01) 4400917



“Comprometidos con
la
salud y la vida”

INFORMACIÓN TÉCNICA



SULFAQUINOXALINA 20%+ TRIMETOPRIM 4% + VITAMINA K3 0.2%
ProtectorK-ST[®]
POLVO SOLUBLE



DURACIÓN E INTERVALO DE TRATAMIENTO:

Bovinos, ovinos, caprinos y porcinos: de 3 a 5 días

Aves: 2 a 3 días.

Conejos: 10 días

Cuyes: 7 días

PERIODO DE RETIRO

Carne: 10 días.

PRECAUCIONES:

Mezclar bien el producto con el alimento o el agua de bebida.

Renovar el alimento o agua de bebida cada 24 horas.

El alimento medicado o agua de bebida debe prepararse justo antes de su administración.

No administrar a vacas lecheras ni ponedoras.

CONSERVACION DEL PRODUCTO.

- Almacenar en lugar fresco entre 15° y 30° C
- Proteger de la humedad y la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- No reutilizar envases vacíos y destruirlos de forma adecuada.

PRESENTACIONES:

ProtectorK-ST se encuentra disponible en las siguientes presentaciones:

Sobres x 15Gr, 200Gr, 500Gr, 1Kg.

Manténgase fuera del alcance de los niños y de animales domésticos



**CENTRO DE LLAMADO
REYTA S.A.C.**

(051) (01) 4400917

Jr. Tupac Amaru N° 1590- La Perla
Callao – Lima - Perú

Oficina: Jr. Tupac Amaru N° 1590- La Perla
Callao – Lima – Perú
E-mail: ventas@reytaperu.com
www.reytaperu.com
Teléfono: (051) (01) 4400917



*“Comprometidos con
la
salud y la vida”*