



INFORMACIÓN TÉCNICA

REYMICINA[®]



Solución inyectable L.A. para uso veterinario

Antibacteriano de amplio espectro con antiinflamatorio, antipirético y analgésico

COMPOSICIÓN:

Oxitetraciclina base	200 mg
Diclofenaco sódico	5 mg
Excipientes c.s.p.	1 ml

DESCRIPCIÓN:

Antibacteriano de amplio espectro a base de oxitetraciclina que en asociación con el diclofenaco un antiinflamatorio no esterooidal, antipirético y analgésico que no causa aborto, con su vehículo de larga acción y liberación lenta se obtiene un efecto prolongado con altos niveles plasmáticos de 3 a 5 días, por lo que con una sola aplicación es suficiente para combatir los microorganismos sensibles a las tetraciclinas.

INDICACIONES DE USO:

Está indicado para el tratamiento y control eficaz de enfermedades y procesos infecciosos causados por microorganismos Gram positivos, Gram negativos, micoplasmas, protozoarios y rikettsias sensibles a la oxitetraciclina en bovinos, ovinos, porcinos y caprinos.

Bovinos: neumonía (fiebre del embarque), pietín, metritis, septicemia, carbunco sintomático, enteritis bacterianas, actinobacilosis, infecciones articulares y umbicales. Prevención y tratamiento de infecciones genitales u obstetricas, heridas infectadas, anaplasmosis, leptospirosis.

Ovinos y caprinos: neumonías, pietín, prevención de infecciones post parto, carbunco sintomático, edema maligno, enterotoxemia, gangrena gaseosa (*Clostridium spp*), actinobacilosis, nefritis, cistitis, mastitis, otras infecciones causados por gérmenes sensibles a la oxitetraciclina.

Porcinos: neumonía por Pasteurella, bronconeumonía, síndrome MMA, control de rinitis atrófica, leptospirosis, diarrea de los lechones, otras infecciones causadas por gérmenes sensibles a la oxitetraciclina.

DOSIFICACION: Vía intramuscular

Bovinos, Camélidos sudamericanos, ovinos, caprinos y porcinos: 1 ml / 10 kg de peso vivo.

Se recomienda que dosis mayores a 10 ml en bovino y 5 ml en ovino, caprino y porcino, se distribuyan en dos puntos de aplicación.

Dosis única, si la enfermedad persiste consulte con su médico veterinario.

Oficina: Jr. Tupac Amaru N° 1590- La Perla
Callao – Lima – Perú
E-mail: ventas@reytaperu.com
www.reytaperu.com
Teléfono: (051) (01) 4400917



*“Comprometidos con
la
salud y la vida”*



INFORMACIÓN TÉCNICA

REYMICINA[®]



PERIODO DE RETIRO:

Bovino, ovino, caprino y porcino:

Carne: 28 días

Leche: No administrar a vacas lecheras en producción ni ovejas o cabras cuya leche se destine al consumo humano.

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO.

No usar en pacientes con insuficiencia renal o hepática.

No usar en animales con hipersensibilidad a los principios activos.

PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE SU USO.

Usar guantes y lavarse las manos tras utilizar el medicamento.

Si se produce accidentalmente exposición de la piel o los ojos, lavar inmediatamente con agua abundante.

No fumar, comer o beber mientras se manipula el medicamento.

CONSERVACION DEL PRODUCTO:

- Almacenar en lugar fresco entre 15° y 30°C.
- Proteger de la humedad y la luz solar.

PRESENTACIONES:

Reymicina se encuentra disponible en las siguientes presentaciones:

Frascos x 10, 20, 50, 100, 250, 500 mL.

Manténgase fuera del alcance de los niños y de animales domésticos



CENTRO DE LLAMADO
REYTA S.A.C.

(051) (01) 440 - 0917

Jr. Tupac Amaru N° 1590 – La perla
CALLAO - LIMA - PERÚ

Oficina: Jr. Tupac Amaru N° 1590- La Perla
Callao – Lima – Perú
E-mail: ventas@reytaperu.com
www.reytaperu.com
Teléfono: (051) (01) 4400917



*“Comprometidos con
la
salud y la vida”*