



INFORMACIÓN TÉCNICA

CALPHOSREY



SOLUCIÓN INYECTABLE PARA USO VETERINARIO

CALCIFICANTE – ENERGIZANTE – MINERALIZANTE - CARDIOTÓNICO

DESCRIPCIÓN:

Calphosrey es un tónico reconstituyente de Calcio – Fósforo – Magnesio – Dextrosa y Cafeína, solución inyectable para el tratamiento y prevención de la Fiebre de Leche además se recomienda en casos de cetosis, raquitismo, envenenamiento por forrajes (Tetania de pastos), intoxicaciones y deficiencias en general.

COMPOSICIÓN:

Cada 100 mL de solución inyectable contiene:

Borogluconato de Calcio	26.00 g
Borogluconato de Magnesio	6.00 g
Dextrosa	15.00 g
Fósforo elemental	0.50 g
Cafeína	0.50 g
Excipientes c.s.p.	100 mL

INDICACIONES DE USO:

En vacunos, equinos, ovinos, caprinos, porcinos, camélidos sudamericanos, caninos y felinos para el tratamiento en estados fisiológicos o patológicos en los que produzca un déficit de calcio, magnesio y fósforo como:

- Gestación, lactación, crecimiento y/o convalecencia.
- Fiebre de leche o eclampsia.
- Tetanias hipocalcémicas / hipomagnesémicas / hipofosfatémias/ acetonemias.
- Estados de debilidad, desnutrición y esterilidad por deficiencia de minerales.

DOSIFICACION:

Aplicar vía endovenosa lenta de preferencia; intramuscular o subcutánea, a razón de 0.5 a 1mL/kg.p.v.:

Bovinos	500 mL
Equinos	250 - 500 mL
Porcinos	50 - 100 mL
Ovinos, caprinos	50 - 100 mL
Camélidos sudamericanos:	50 - 100 mL
Caninos	5 - 10 mL
Felinos	2.5 - 5 mL

PERIODO DE RETIRO:

No presenta ningún periodo de retiro en carne ni en leche.





INFORMACIÓN TÉCNICA

CALPHOSREY



CONTRAINDICACIONES:

A las dosis recomendadas no presenta ninguna.

PRECAUCIONES:

- No usar en casos de hipersensibilidad a las sustancias activas.
- No usar en animales hiperexitados, puede ocurrir muerte repentina.
- No usar en animales con diabetes no tratada.
- Debe confirmarse la hipocalcemia / hipomagnesemia / hipofosfatemia antes de iniciar el tratamiento.
- Antes de utilizar el producto debe estar a temperatura corporal.
- La administración intravenosa se realiza lentamente y con rigurosa asepsia.
- La inyección subcutánea o intramuscular en volúmenes grandes inyectar en diferentes puntos que no pase de 20 mL.
- Tener precaución en animales con enfermedades renales, es la principal causa de hipermagnesemia.
- No debe administrarse con agentes oxidantes, citratos y carbonatos solubles; fosfatos y sulfatos; cefalexina sódica, tetraciclinas y estreptomicina sulfato.
- No administrar juntamente con glucósidos cardiotónicos y digitálicos, puede producir arritmias.
- No administrar junto con diuréticos porque aumenta la eliminación del medicamento por la orina.
- La administración junto con agentes bloqueantes neuromusculares potencia el efecto bloqueante.
- La administración en animales tratados con gentamicina provoca un aumento de los requerimientos de magnesio debido a un incremento de la excreción renal de magnesio.

CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO:

- Almacenar en lugar fresco entre 15° y 30° C
- Proteger de la humedad y la luz solar.
- No reutilizar envases vacíos y destruirlos de forma adecuada.

PRESENTACIONES: Calphosrey® se encuentra disponible en la siguiente presentación:

Frasco x 500 mL.

REG. SENASA: F.F4.01.N.0153

Manténgase fuera del alcance de los niños.

