



## INFORMACIÓN TÉCNICA

TILOSINA 50% + AMOXICILINA 10% + VITAMINA B12

**CORRALIN-PS**<sup>®</sup>  
POLVO SOLUBLE



## Polvo soluble para uso veterinario

### POTENTE ANTIBIOTICO SINÉRGICO DE AMPLIO ESPECTRO

#### COMPOSICIÓN:

Cada 100 g contiene:

Tilosina tartrato	50.0 g
Amoxicilina Trihidratada	10.0 g
Vitamina B12	200.0 ug
Excipientes c.s.p.	100.0 g

#### INDICACIONES:

**Corralin-PS** está indicado para el control y tratamiento de enfermedades infecciosas respiratorias, gastro intestinales, urogenitales e infecciones de piel y tejidos blandos en bovinos, porcinos y aves, causada por gérmenes Gram positivos y Gram negativos susceptibles a la Tilosina y amoxicilina.

#### Enfermedades susceptibles:

*Actinobacillus pleuroneumonía, Streptococcus suis, Pasteurella multocida, Escherichia coli, Streptococcus suis, Pasteurella spp., Haemophilus spp., Mannheimia haemolytica, P. multocida, H. sommus, S. aureus, P. multocida, M. haemolytica, Haemophilus spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Fusobacterium necrophorum. Vibrio spp., Escherichia spp., Moraxella spp., Spherophorus necrophorus (Fusobacterium necrophorus) y sobre Chlamydia spp. y Mycoplasma spp., Mycoplasma gallinarum y Mycoplasma sinoviae.*

#### ESPECIES DE DESTINO:

Bovinos, ovinos, porcinos, aves (pollos y pavos).

#### ADMINISTRACIÓN: Oral.

**Aves:** Con el agua de bebida.

**Bovinos (Terberos):** Con el agua de bebida o leche.

**Porcinos:** Con agua de bebida o mezclado con el alimento.

#### DOSIFICACION:

**Aves:** 100-150 mg/Kg p.v.

Para usos practico utilizar 0.5 – 1 Kg /1000- 2000 L de agua de bebida.

**Bovinos:** 1.6 g/ 20 Kg de peso vivo.

Disolver la cantidad de producto en una toma suficiente de agua o leche.

**Porcinos:** 1 g/10 Kg p.v.

Disolver una cantidad suficiente de agua o mezclar una cantidad prudente de alimento, para garantizar el completo consumo de la dosis.





## INFORMACIÓN TÉCNICA

TILOSINA 50% + AMOXICILINA 10% + VITAMINA B12

**CORRALIN-PS**<sup>®</sup>  
POLVO SOLUBLE



### DURACIÓN E INTERVALO DE TRATAMIENTO:

**Aves y porcinos:** Cada 24 horas de 3 a 5 días.

**Bovinos:** Cada 12 horas de 3 a 5 días.

La dilución debe ser renovada cada 12 horas.

### PERIODO DE RETIRO

**Bovinos (Terberos):** 20 días.

**Aves:** Pollos 2 días, pavos 5 días.

**Porcinos:** 14 días.

### PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES:

Mezclar bien el producto con el alimento o el agua de bebida.

Después de mezclarse con el agua, leche o alimento el producto tiene una duración máxima de 24 horas.

Para el caso de la dosificación de bovinos se recomienda preparar el producto por cada administración, desechando los restos de la dosis anterior.

No administrar a productoras de huevos para consumo humano.

No administrar con antibióticos bacteriostáticos puesto que limitarían la acción tanto de la amoxicilina como la Tilosina.

### CONSERVACION DEL PRODUCTO.

- Almacenar en lugar fresco entre 15° y 30° C
- Proteger de la humedad y la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- No reutilizar envases vacíos y destruirlos de forma adecuada.

### PRESENTACIONES:

**Corralin PS**, se encuentra disponible en las siguientes presentaciones:

Sobres x 10Gr, 200Gr, 500Gr, 1Kg.

**Manténgase fuera del alcance de los niños y de animales domésticos**



CENTRO DE LLAMADO

REYTA S.A.C.

**(051) (01) 4400917**

Calle Mama Ocllo N° 416 - La Perla

Callao – Lima - Perú

Oficina: Jr. Tupac Amaru N° 1590- La Perla

Callao – Lima – Perú

E-mail: [ventas@reytaperu.com](mailto:ventas@reytaperu.com)

[www.reytaperu.com](http://www.reytaperu.com)

Teléfono: (051) (01) 4400917



*“Comprometidos con  
la  
salud y la vida”*