



INFORMACIÓN TÉCNICA



Antiparasitario externo de amplio espectro

PROPIEDADES:

Freegan es un antiparasitario externo de amplio espectro, se aplica en el dorso del animal distribuyéndose perfectamente por toda la piel y el pelo de los animales por su gran afinidad hacia las glándulas sebáceas y sus secreciones.

COMPOSICIÓN:

Cada ml contiene:

Fipronil.....10 mg
Excipientes c.s.p.....1 ml

INDICACIONES:

Por los componentes de su fórmula y de acuerdo con lo mencionado previamente, **FREEGAN**, se utiliza en Bovinos, ovinos, camélidos sudamericanos, equinos y cuyes: Usado para el control efectivo contra infestaciones de *Boophilus microplus* (garrapata), *Dermatobia hominis* (miasis nodular o tupe), *Melophagus ovinus* (Moscas o falsa garrapatas) por 6 semanas; *Haematobia irritans* (mosca de los cuernos) por 4 semanas; *Linognathus vituli* (piojos chupadores), *Damalinia bovis* (piojos masticadores) por 42 días y para la prevención de *Cochliomyia hominivorax* (mosca del gusano barredor).

Aves: *Echidnophaga gallinacea* (pulgas), *Menopon gallinae*, *Lipeurus caponis* (piojos) y *Dermanyssus gallinae* (ácaro rojo).

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Vía epicutánea.

DOSIFICACIÓN:

Bovinos, ovinos, camélidos y equinos: aplicar 1 ml por cada 10 kg de peso vivo tópicamente a lo largo de la línea dorsal en la banda estrecha que se extiende desde la cruz hasta la base de la cola y en cuyes y aves aplicar 0.1 ml por cada kg de peso vivo. Dosis única.

PERIODO DE RETIRO:

Carne: 100 días

Leche: No utilizar en animales productores de leche para el consumo humano. No utilizar en vacas lecheras que no están en lactación incluyendo las vacas gestantes en los 60 días anteriores al parto.

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO:

- No usar durante el periodo de lactación.
- No usar durante el primer trimestre de la gestación.





INFORMACIÓN TÉCNICA



- No usar en animales con hipersensibilidad conocida a la sustancia activa.

PRECAUCIONES GENERALES:

- Evitar el contacto directo con la piel y los ojos.
- Utilizar guantes de látex, mascarilla y ropa adecuada para la manipulación y aplicación del producto.
- Si se produce contacto accidental de la piel, lavar la zona afectada inmediatamente con agua y jabón.
- Si se produce exposición accidental en los ojos, enjuagarlos inmediatamente con agua.
- No fumar, comer ni beber durante la manipulación del medicamento veterinario. Las personas con hipersensibilidad conocida a la sustancia activa deben evitar todo contacto con el medicamento veterinario.

CONSERVACION DEL PRODUCTO:

Almacenar en lugar fresco entre 15° y 30° C.

Proteger de la humedad y la luz.

PRESENTACIONES:

FREEGAN: se encuentra disponible en las siguientes presentaciones:

Frascos x 30, 120, 500, 1L.

Manténgase fuera del alcance de los niños y de animales domésticos

NOTA: CATEGORIA TOXICOLÓGICAII - MODERADAMENTE PELIGROSO.



CENTRO DE LLAMADO

REYTA S.A.C.

(051) (01) 440 - 0917

Calle Mama Ocllo N° 416

La perla - Callao

LIMA - PERÚ

