



INFORMACIÓN TÉCNICA

REYALPO[®] 25
ALBENDAZOL 25% + COBALTO 2% 1



POTENTE ANTIPARASITARIO INTERNO DE AMPLIO ESPECTRO

Suspensión oral para el tratamiento y control de Fasciola hepática en todos sus estadios, parásitos gastro intestinales, pulmonares y tenias.

REYALPO 25 está indicado para el tratamiento y control de nemátodos gastrointestinales, pulmonares, tenias y fasciolas adultas. Incluye en su fórmula el cobalto que ofrece una acción directa en la prevención de anemias y mejor funcionamiento del organismo de los animales.

COMPOSICIÓN:

Cada 100 mL contiene:

Albendazol	25.0 g.
Sulfato de cobalto	2.0 g.
Excipientes c.s.p.	100.0 mL

ESPECIES INDICADAS:

Bovinos, ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos.

INDICACIONES:

Agentes etiológicos susceptibles:

Nemátodos gastrointestinales: Formas maduras e inmaduras de *Trichostrongylus spp.*, *Cooperia spp.*, *Ostertagia spp.*, *Haemonchus spp.*, *Nematodirus spp.*, *Bunostomum spp.*, acción en adultos de *Oesophagostomum sp.*, acción menor en *Bunostomum phlebotomum*. Actúa sobre formas de *Ostertagia ostertagi*.

Nemátodos pulmonares: *Protostrongylus spp.*, *Dictyocaulus spp.*, *Strongyloides spp.*

Cestodos: *Moniezia spp.*

Trematodos: *Fasciola hepática* adulta.

ADMINISTRACIÓN: Vía oral.

DOSIFICACIÓN:

Nemátodos gastrointestinales, pulmonares y cestodos: 1mL/50 Kg.p.v.

Larvas de *O. ostertagi*: 1mL/33 Kg.p.v.

Fasciola hepática adulta: 1mL/25 Kg.p.v.





INFORMACIÓN TÉCNICA

REYALPO[®] 25
ALBENDAZOL 25% + COBALTO 2% **1**



PERIODO DE RETIRO:

Bovinos:

Carne: 27 días.

Leche: 3 días.

Ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos:

Carne: 7 días.

Leche: 3 días.

CONTRA INDICACIONES:

En caso de insuficiencia hepática, gestación, vacas lecheras lactantes.

No administrar a vacas, ni ovejas en los primeros 45 días de gestación o hasta los 45 días de haber retirado los toros o carneros del servicio.

No administrar a cabras durante los 30 días de gestación o hasta 30 días después de haber retirado el macho.

PRECAUCIONES:

Agitar el producto antes de utilizar.

Monitorear la evolución del animal.

RECOMENDACIONES:

- Venta bajo prescripción del Médico Veterinario.
- No beber, fumar o comer durante el tratamiento.
- Lavarse las manos después del tratamiento.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

INOCUIDAD:

En dosis recomendadas no tiene ninguna contraindicación aún en animales debilitados o altamente parasitados.

COMPATIBILIDAD:

Reyalpo[®] 25 puede ser aplicada simultáneamente con vitaminas y minerales.





INFORMACIÓN TÉCNICA

REYALPO[®] 25
ALBENDAZOL 25% + COBALTO 2% **1**



CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO

Almacenar en lugar fresco entre 8° y 30°C.

Proteger de la humedad y la luz solar.

PRESENTACIONES:

Reyalpo[®] 25 se encuentra disponible en las siguientes presentaciones:

Frascos 250, 500, 1000 mL.

Sachets x 30 mL

REG. SENASA: F.008.002.N.01293

Manténgase fuera del alcance de los niños.



CENTRO DE LLAMADO
REYTA S.A.C.

(051) (01) 440 – 0917

Calle Mama Ocllo N° 416 - La Perla
Callao - LIMA - PERÚ

