



INFORMACIÓN TÉCNICA



# Reyflex® L.A.

Enrofloxacina 20% + Diclofenaco 3%

## Solución inyectable para uso veterinario

**Antibacteriano de amplio espectro con antiinflamatorio, antipirético y analgésico**

### COMPOSICIÓN:

Cada 1 ml contiene:

Enrofloxacina 200 mg

Diclofenaco 30 mg

Excipientes c.s.p. 1 ml

### DESCRIPCIÓN:

Antibacteriano de amplio espectro a base de enrofloxacina que en asociación con el diclofenaco un antiinflamatorio no esterooidal, antipirético y analgésico que no causa aborto, con su vehículo de larga acción y liberación lenta se obtiene un efecto prolongado con altos niveles plasmáticos de 3 a 5 días, por lo que con una sola aplicación es suficiente para combatir los microorganismos sensibles a la enrofloxacina.

### INDICACIONES DE USO:

Antibacteriano de amplio espectro y larga duración con antiinflamatorio no abortivo, indicado para los procesos infecciosos con reacción inflamatoria, dolorosa y febril. Para el tratamiento de gérmenes sensibles a la Enrofloxacina como Gram positivos, Gram negativos y micoplasmas; *Pasteurella* sp., *Escherichia coli*, *Klebsiella* sp., *Staphylococcus* sp., *Proteus* sp., *Salmonella* sp., *Streptococcus suis*, *Shigella* sp., *Yersinia* sp., *Vibrio* sp., *Campylobacter* sp., *F necrophorum*, *Moraxella* sp., *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Actinobacillus suis*, *Corynebacterium* sp., *Bordetella* sp., *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Haemophilus* sp.

#### **Bovinos**

Tratamiento de las infecciones del tracto respiratorio causadas por cepas de *Pasteurella multocida*, *Mannheimia haemolytica* y *Mycoplasma spp.* sensibles a la enrofloxacina. Tratamiento de las infecciones del tracto digestivo causadas por cepas de *Escherichia coli* sensibles a la enrofloxacina. Tratamiento de la septicemia causadas por cepas de *Escherichia coli* sensibles a la enrofloxacina. Tratamiento de la artritis aguda asociada a micoplasmas, causada por *Mycoplasma bovis* sensibles a la enrofloxacina.

#### **Ovino**

Tratamiento de las infecciones del tracto digestivo causadas por cepas de *Escherichia coli* sensibles a la enrofloxacina. Tratamiento de la septicemia causada por cepas de *Escherichia coli* sensibles a la enrofloxacina.

Tratamiento de la mastitis causada por cepas de *Staphylococcus aureus* y *Escherichia coli* sensibles al enrofloxacino.

#### **Caprino/Camélido sudamericano**

Tratamiento de las infecciones del tracto respiratorio causadas por cepas de *Pasteurella multocida* y *Mannheimia haemolytica* sensibles a la enrofloxacina. Tratamiento de las infecciones del tracto digestivo causadas por cepas de *Escherichia coli* sensibles a la enrofloxacina. Tratamiento de la

Oficina: Calle Mama Ocllo N° 416 - La Perla  
Callao – Lima – Perú  
E-mail: [ventas@reytaperu.com](mailto:ventas@reytaperu.com)  
[www.reytaperu.com](http://www.reytaperu.com)  
Teléfono: (051) (01) 4400917



“Comprometidos con  
la  
salud y la vida”



## INFORMACIÓN TÉCNICA

# Reyflex<sup>®</sup> L.A.

Enrofloxacin 20% + Diclofenaco 3%



septicemia causada por cepas de *Escherichia coli* sensibles a la enrofloxacin. Tratamiento de la mastitis causada por cepas de *Staphylococcus aureus* y *Escherichia coli* sensibles a la enrofloxacin.

### Porcino

Tratamiento de las infecciones del tracto respiratorio causadas por cepas de *Pasteurella multocida*, *Mycoplasma spp.* y *Actinobacillus pleuropneumoniae* sensibles a la enrofloxacin. Tratamiento de las infecciones del tracto digestivo causadas por cepas de *Escherichia coli* sensibles a la enrofloxacin. Tratamiento de la septicemia causada por cepas de *Escherichia coli* sensibles a la enrofloxacin.

### DOSIFICACION: Vía intramuscular o subcutánea

#### Bovino:

1 mL por 80 kg de p.v.

#### Ovino, caprino, porcino y camélido sudamericano:

1 mL por 40 kg de p.v.

En aplicaciones intramusculares y subcutáneas se aconseja que el volumen administrado por lugar de aplicación se reduzca de acuerdo con la edad y el tamaño del animal para que en el caso de los animales más pequeños solo se le inyecta de 1 a 4 mL por lugar de aplicación. Se debe de inyectar no más de 10 mL por lugar de aplicación en ganado adulto y 5mL en cerdos, ovinos y camélidos adultos.

Dosis única, o a criterio del Médico Veterinario tratante.

Si bien es cierto por la característica del producto, en la mayoría de los casos será suficiente una sola aplicación, sin embargo, pueden existir casos donde se requiera una segunda aplicación 48 horas después. De no ceder, se recomienda reevaluar el diagnóstico.

### PERIODO DE RETIRO:

Carne: 28 días

Leche: No administrar en ganado lechero en lactación.

### CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO.

Efectos colaterales posibles (locales o generales), incompatibles y antagonismos farmacológicos.

- No usar enrofloxacin de forma concomitante con sustancias antimicrobianas de acción antagonista a la de las quinolonas (p. Ej. Macrólidos, tetraciclinas o fenicoles)
- No utilizar simultáneamente con teofilina, ya que puede retrasarse la eliminación de teofilina.
- No usar en animales que padezcan trastornos gastrointestinales, en particular en presencia de lesiones ulcerativas, ni disfunción hepática, cardiaca o renal.

**A las dosis indicadas no presenta efectos colaterales, incompatibilidades y/o antagonismos.**





## INFORMACIÓN TÉCNICA

# Reyflex<sup>®</sup> L.A.

Enrofloxacin 20% + Diclofenaco 3%



### PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE SU USO.

- Usar guantes y lavarse las manos tras utilizar el medicamento.
- Si se produce accidentalmente exposición de la piel o los ojos, lavar inmediatamente con agua abundante.
- No fumar, comer o beber mientras se manipula el medicamento.

### CONSERVACION DEL PRODUCTO:

- Almacenar en lugar fresco entre 15° y 30°C.
- Proteger de la humedad y la luz solar.

### PRESENTACIONES:

**Reyflex L.A.** se encuentra disponible en las siguientes presentaciones:

Frascos x 10, 20, 50, 100, 250, 500 mL.

**Manténgase fuera del alcance de los niños y de animales domésticos**



CENTRO DE LLAMADO  
REYTA S.A.C.

(051) (01) 440 - 0917  
Calle Mama Ocllo N° 416 – La perla  
CALLAO - LIMA - PERÚ

Oficina: Calle Mama Ocllo N° 416 - La Perla  
Callao – Lima – Perú  
E-mail: [ventas@reytaperu.com](mailto:ventas@reytaperu.com)  
[www.reytaperu.com](http://www.reytaperu.com)  
Teléfono: (051) (01) 4400917



*“Comprometidos con  
la  
salud y la vida”*